



Foto: Banangraut (Wikimedia Commons)

Vaccinium uliginosum

El arándano negro aparece poco representado en el Mapa Forestal limitándose a enclaves pirenaicos y cantábricos, donde forma parte de brezales, matorrales o formaciones subalpinas en áreas frías y venteadas. Aparece entre los 1500 y 2700 m en zonas con temperaturas estivales tanto mínimas como máximas frías y precipitaciones altas.

SITUACIÓN ACTUAL



■ Presencia
■ Área potencial

SITUACIÓN FUTURA

■ CGCM2
■ ECHAM4
■ CGCM2 y ECHAM4

Evolución prevista

Los modelos prevén su desaparición sin que se abran nuevas zonas de distribución potencial.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 47 (6%)
- área potencial: 684

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	0 (0%)	17 (2%)	0%	0%
• 2041-2070	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
• 2071-2100	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
ECHAM4				
• 2011-2040	6010 (879%)	4306 (630%)	15%	23%
• 2041-2070	109 (16%)	495 (72%)	0%	2%
• 2071-2100	82 (12%)	1 (0%)	0%	0%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

1. Recolección de germoplasma.