


3.2.8. Sureste de Badajoz



Mapa 18. Área de Sureste de Badajoz en cuadrículas UTM de 10 x 10 km, y cuadrículas prospectadas en el presente trabajo.
Map 18. The southeast Badajoz Province area and the 10 x 10 km UTM squares surveyed in the present study.

Área de estudio

Este área comprende una franja, de entre 10 y 15 km de ancho, al sureste de Badajoz, que limita al este con el límite provincial de Ciudad Real, y desde el embalse de Cíjara por el norte, hasta la confluencia de las provincias de Córdoba y Sevilla por el sur, que incluiría parte de los términos municipales de Siruela, Garlitos, Capilla, Peñalsordo, Zarza-Capilla, Cabeza del Buey, Monterrubio de la Serena, Peraleda del Zaucejo, Campillo de Llerena, Granja de Torrehermosa y Azuaga. Esta zona no se había prospectado en estudios anteriores.

Búsqueda de indicios indirectos

Se muestrearon un total de 17 cuadrículas (Mapa 18), empleando 136 horas de muestreo sistemático, durante las que se recogieron y analizaron 7 excrementos, sin resultados positivos de presencia de lince.

Abundancia relativa del conejo

La escasez de conejo es la norma que se observa de forma generalizada en toda el área de estudio, con ausencia o baja abundancia en todas las cuadrículas (Tabla 21, Mapa 8). Únicamente en parte de los términos municipales de



Sierras cubiertas de matorral mediterráneo en Badajoz.

Zarza-Capilla y la Dehesa de los Alta-rejos en Azuaya, se han encontrado pequeños enclaves con indicios de su presencia.

CATEGORÍAS	CUADRÍCULAS	
ABUNDANCIA	MUESTREADAS	%
Ausente	4	22,20
Baja	14	77,80
Media	0	0,00
Alta	0	0,00
Muy alta	0	0,00
TOTAL	18	

Tabla 21. Resultados de los muestreos de abundancia relativa de conejo (N letrinas/hora de muestreo) en cada una de las cuadrículas UTM 10 x 10 km consideradas para el área del Sureste de Badajoz.

Table 21. Rabbit relative abundance survey results (latrines/survey hour) in the 10 x 10 km UTM squares considered in the south-east Badajoz Province.

Evolución y situación actual

Aunque, como ya se ha dicho, esta zona del sureste de la provincia de Badajoz no había sido muestreada en anteriores trabajos, es un área en contacto directo con los núcleos de población descritos en el trabajo de 1988, de Cíjara, Herrera del Duque, Gadiana, Almadén, Santa Eufemia y Sierra norte de Sevilla. Este hecho, sumado a la acumulación histórica de avistamientos de lince, hacía pensar que este territorio podría haber formado parte de los núcleos de población citados y del corredor existente entre Sierra Morena y los Montes de Toledo. Sin embargo, en este trabajo no se han encontrado indicios de la presencia de lince ibérico, lo que unido a la notable escasez de conejos detectada, hace pensar que la existencia de individuos en estos parajes es un hecho improbable.